

## **Prova para o Título de Especialista em Psiquiatria da Infância e da Adolescência – 1998**

### **Questões dissertativas**

- 1) Descreva as características afetivas (emocionais) e cognitivas da criança em idade escolar (7 a 11 anos).
- 2) Descreva as fases evolutivas do ciclo de vida familiar.
- 3) Quais os principais modelos psicoterápicos aplicáveis na infância e adolescência, e quais as principais indicações de cada um?
- 4) Perante uma criança em idade escolar com distúrbio de aprendizado, esquematize os possíveis transtornos mentais, situações conflitivas individuais e familiares e aspectos sociais que possam estar envolvidos na gênese do problema.
- 5) Estabeleça um programa terapêutico ideal para uma criança de 3 anos de idade, portadora de Autismo Infantil.

### **Questões de múltipla escolha**

- 1) Em 1909, é descrita a primeira patologia específica em Psiquiatria Infantil. Seu nome era:
  - a) Demência precocíssima
  - b) Demência de Heller
  - c) Demência de Kramer
  - d) Autismo Infantil

- 2) Em relação ao Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, são corretas as seguintes afirmações:

- I) ocorre em 3% a 5% das crianças em idade escolar
- II) os sintomas são autolimitados à infância, sendo que na maioria dos casos o prejuízo decorrente desses sintomas desaparece com a adolescência
- III) a indicação psicofarmacológica baseia-se na presença de comorbidade
- IV) na idade pré-escolar, os sintomas de atenção são mais proeminentes que os de hiperatividade.

- a) I, II
- b) I e III
- c) II e III
- d) II e IV

- 3) Psicopatologicamente, são freqüentes na anorexia nervosa:

- a) delírio autoscópico e negativismo
- b) alucinações somáticas
- c) distúrbios de imagem corporal e negação da doença
- d) delírios de grandeza e de perseguição.

- 4) Mericismo, uma característica comportamental que pode ser encontrada em quadros de retardo mental profundo, em psicoses infantis e mesmo em crianças normais, corresponde a:
- ingestão de material inapropriado para alimentação
  - regurgitação voluntária de alimento do estômago
  - ingestão excessiva de líquido hipertônico
  - bulimia inextinguível associada a vômitos.
- 5) Não é utilizado no tratamento da enurese:
- desmopressina
  - terapia comportamental de reforço positivo
  - antidepressivos tricíclicos
  - risperidona.
- 6) Você considera fundamental na utilização de antidepressivos tricíclicos:
- controle de peso
  - monitoramento cardíaco
  - provas de função renal
  - provas de função hepática.
- 7) Qual do(s) seguinte(s) fenômeno(s) abaixo listados podemos observar freqüentemente no tratamento de crianças com transtornos mentais crônicos?
- desânimo dos profissionais com os poucos resultados obtidos
  - a tentativa de engajar obrigatoriamente a família dos pacientes
  - desespero familiar diante do problema
  - todas as anteriores.
- 8) Em relação à ética na Psiquiatria da Infância e da Adolescência assinale a alternativa correta:
- o compromisso fundamental do profissional é a satisfação parental com o tratamento
  - a pesquisa só é admissível quando o risco é menor que o mínimo
  - a indicação terapêutica deve levar em conta a equação custo-benefício
  - todas as informações obtidas no trabalho clínico com a criança são de livre acesso aos pais.
- 9) A descrição feita em 1888 de tiques, ecolalia e coprolalia caracterizava:
- Coréia de Sydeham
  - TOC na infância
  - Gilles de la Tourette
  - Esquizofrenia Infantil
- 10) Em relação à esquizofrenia podemos afirmar que:
- a prevalência é baixa antes da puberdade
  - os sintomas clássicos de alucinação e delírios não são parte fundamental do quadro clínico na infância e adolescência
  - na criança o prejuízo no funcionamento pode apresentar-se por uma dificuldade em se atingir os marcos esperados do desenvolvimento
  - a resposta à medicação antipsicótica é melhor do que a observada na esquizofrenia do adulto.
- São corretas:
- I e IV
  - II e III
  - I e III
  - II e IV
- 11) Tomando por base o exame psiquiátrico relacione a coluna de cima com a de baixo:
- ( ) Depressão  
 ( ) T. Conduta  
 ( ) T. Mental Orgânico  
 ( ) TDAH  
 ( ) S. Asperger
- (I) Alteração de consciência  
 (II) Déficit social e linguagem preservada  
 (III) Irritabilidade  
 (IV) Impulsividade  
 (V) Violação de regras
- III, V, I, V, II
  - II, I, IV, V, III
  - I, III, IV, II, V
  - V, III, II, IV, I

12) Em relação às afirmativas abaixo são corretas:

- I) os sistemas classificatórios modernos, como o DSM-IV, levam em consideração o desenvolvimento infantil
  - II) a CID 10 é um sistema que apresenta critérios mais operacionalizados do que o DSM-IV para o diagnóstico dos transtornos mentais na infância
  - III) o DSM IV privilegia, em relação à CID 10, a noção de comorbidade
  - IV) o DSM IV é um sistema classificatório de pouca utilidade clínica para o diagnóstico de transtornos mentais em crianças abaixo dos 4 anos de idade.
- a) I e II
  - b) I e III
  - c) II e III
  - d) III e IV

Uma criança com 10 anos de idade sofre acidente automobilístico no qual morrem ambos os genitores. Até o momento apresentava desenvolvimento normal. O psiquiatra da infância e da adolescência é chamado pela Pediatria, para consultoria, 10 dias após o acidente. À anamnese e ao exame clínico, a criança apresenta-se, na maior parte do dia, irritada, com perda de apetite, insônia inicial e dificuldade de concentração. Refere alguns episódios de tonturas e cefaléia frontal.

13) Do ponto de vista psiquiátrico, o diagnóstico mais provável é:

- a) Transtorno de Ansiedade
- b) Reação de Ajustamento
- c) Depressão Maior
- d) Transtorno Abrangente de Desenvolvimento.

14) A conduta terapêutica mais adequada seria:

- a) utilização de antidepressivos tricíclicos
- b) intervenção psicoterápica
- c) uso de antipsicóticos
- d) utilização de carbamazepina.

Uma criança com 7 anos de idade é levada ao psiquiatra da infância e da adolescência com quadro caracterizado por dificuldades em permanecer na sala de aula sozinho, medo de que algo ruim aconteça com a mãe se sair de casa para brincar com os amigos, telefonema seguidos para o trabalho dos pais. Ao exame não entra na sala sem ser acompanhado pelos pais.

Embora mostre-se ansiosa, não se evidenciam sintomas autonômicos. Sempre foi retraída, sendo que o início dos sintomas descritos ocorreu por ocasião da entrada na escola.

15) Do ponto de vista psiquiátrico, o diagnóstico mais provável é:

- a) Psicose Simbiótica
- b) Transtorno de Ansiedade Generalizada
- c) Transtorno de Ansiedade de Separação
- d) Transtorno de Pânico

16) Em relação à conduta terapêutica qual recurso você **não** empregaria?

- a) utilização de antidepressivos tricíclicos
- b) intervenção psicoterápica comportamental
- c) afastamento das atividades para diminuição do quadro ansioso
- d) utilização de IRSSe.

17) Assinale a alternativa correta:

- a) a característica sintomatológica principal do Transtorno Bipolar de Humor em crianças é a presença de ideação delirante persecutória, diferentemente do adulto
- b) a prevalência de transtorno de conduta é maior em meninas que em meninos
- c) existe alta comorbidade entre os transtornos de conduta e o transtorno do déficit de atenção/hiperatividade na infância e adolescência
- d) a intervenção terapêutica principal nos quadros de transtorno de conduta com agressividade marcada é de caráter psicofarmacológico.

18) Assinale a afirmativa **incorreta**:

- a) o uso abusivo de drogas na adolescência frequentemente está associado a problemas de conduta, infreqüência e reprovação escolar
- b) para o diagnóstico de abuso de substâncias na adolescência é fundamental a presença de tolerância e sintomas de abstinência com a retirada da substância
- c) atualmente a maconha é a droga ilícita com maior prevalência na adolescência, no Brasil
- d) a pressão do grupo de pares parece ser fator importante na gênese do abuso de substâncias na adolescência.

19) Em relação às afirmativas abaixo, são corretas:

I - em relação ao abuso sexual, na maioria dos casos, o abusador não pertence à constelação familiar

II - durante a avaliação de crianças com abuso sexual é freqüente a presença de sintomas de ansiedade e de características repetidas de reencenação de situações traumáticas nos jogos e brincadeiras

III - parece haver uma transmissão transgeracional das situações de abuso físico

IV - apenas os casos comprovados de abuso físico ou sexual implicam na recomendação de separação criança/família para avaliação e proteção dela.

- a) I, II
- b) II, III
- c) II, IV
- d) I, IV

20) Em relação às afirmativas abaixo, são corretas:

I - a prevenção primária em Psiquiatria da Infância e da Adolescência refere-se aos esforços desenhados para minimizar as seqüelas dos transtornos mentais estabelecidos

II - Resiliência refere-se à capacidade de adaptação bem-sucedida apesar da presença de vários fatores de risco para transtorno mental, estresse crônico ou trauma severo

III - os terrores noturnos caracterizam-se pela presença de baixa atividade autonômica e lembrança do episódio na manhã seguinte

IV - os pesadelos ocorrem caracteristicamente na fase de sono REM.

- a) I, III
- b) II, III
- c) III, IV
- d) II, IV

Quanto ao gabarito do teste, lá vai:

1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - b; 5 - d; 6 - b; 7 - d; 8 - c; 9 - c; 10 - c; 11 - a; 12 - d; 13 - b; 14 - b; 15 - c; 16 - c; 17 - c; 18 - b; 19 - b; 20 - d.

*Um abraço do  
Francisco Assumpção*